


geert@starre.info

ZOMERKENMERKEN NAALDBOMEN

meest gebruikte bronnen:

Henk Pseudospeed `Bootii`

http://www.baumkunde.de/baumlisten/baumliste_az_scientific.php



Chamaecyparis lawsoniana - Californische cypres

aanliggend

kleiner

puntig

lichte onderkant
groter

Thuja plicata - reuzenlevensboom

777 Metasequoia glyptostroboides watercipres
782 Sequoiadendron giganteum mammoetboom
792 Taxodium distichum moerascipres



Mg

Sg

Td



Abies grandis - reuzen zilverspar

Bladen 25..50 mm, 2 helder witte strepen onderzijde,
in midden het breedst, in 2 vlakke rijen



Larix kaempferi - Japanse lariks (Japanse lork)

bladverliezend, naalden in kluitjes
2 witte huidmondstrepen
ronde kegels blijven aan takje, zijtakjes als Ginkgo



Cedrus libani - himalayaceder

korte loten met bladrozet

top: lange loten met verspreide bladen



staalblauw

Cedrus libani 'Glauca' - Libanonceder



Picea abies - fijnspar

naalden smal en scherp, regelmatig rondom tak!,
beetje hout komt mee bij lostrekken naald

Pseudotsuga menziesii - douglasspar

kapotgevreven naalden ruiken naar sinasappel
kegel met driepuntige dunne schubben tussen de dikkere

naalden in 2 tallen

8..16 cm

Pinus nigra - zwarte den

3..7 cm

Pinus sylvestris - grove den



www.baumkunde.de



www.baumkunde.de



www.baumkunde.de

Tsuga heterophylla - westerse hemlock (westerse!)

bladen 6..22 mm, 2 helder witte strepen onderzijde, in midden het breedst



heterophylla: ongelijke bladen
kortste boven de loot omgedraaid



Taxus baccata - gewone taxus

enige naaldboom met groene eindtakken, rode vruchten



Vorderseite



Rückseite

www.baumkunde.de



©2014
geert@starre.info